

MUSON

Шипучі водорозчинні таблетки

90 таблеток

Медичний виріб у вигляді шипучих таблеток для розчинення у воді.

ПОКАЗАННЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ: Підтримка правильної гігієни ротової порожнини; допомога у лікуванні запальних захворювань ясен, пародонту, афт; допомога у лікуванні сезонних інфекцій а також інших запальних станів ділянки ротової порожнини і горла.

ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ВИКОРИСТАННЯ:

1. Вкинути 1 таблетку у 100 мл холодної води (біля половини склянки) і почекати до повного розчинення таблетки (біля 30-40 с).
2. Кілька разів прополоскати ротову порожнину приготованим розчином.
3. Виплюнути. Не ковтати. Використати безпосередньо після приготування. Не зберігати. Осад, що утворюється після розчинення таблетки є натуральною властивістю шипучих продуктів.

МЕХАНІЗМ ДІЇ: Редукує кількість мікроорганізми, що містяться у ротовій порожнині; зменшує ризик перенесення мікроорганізмів до осіб, що перебувають у найближчому оточенні та поширення хвороб, що передаються краплинним шляхом; допомагає утриманню відповідної мікрофлори ротової порожнини, охороняючи від розвитку хвороботворних мікроорганізмів. MUSON є безпечним препаратом і може використовуватись за індивідуальними потребами, як для полоскання ротової порожнини так і горла. Не містить алкоголю, тим самим може застосовуватись багаторазово протягом доби без ризику осушення слизової оболонки ротової порожнини.

СКЛАД: Хлоргексидину діацетат, лимонна кислота, винна кислота, гідрокарбонат натрію, сорбітол, м'ятний аромат.

ПРОТИПОКАЗАННЯ: Не застосовувати у випадку чутливості на будь-який з компонентів препарату.

ПОБІЧНА ДІЯ: Не виявлено, однак у осіб з підвищеною чутливістю не можна виключити виникнення алергічних реакцій. У випадку виникнення алергічної реакції, припинити застосування виробу. У випадку гострих запальних станів слизової оболонки чи відкритих ран порожнини рота, розчин таблетки MUSON може викликати больові реакції.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ТА ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ: Таблетки MUSON є дуже гігроскопічними. Після виймання таблетки з упаковки треба відразу щільно закрити флакон. При тривалому зберіганні таблетки можуть потемніти. Це природній процес, який ніяк не впливає на ефективність виробу. Може застосовуватись при виразковій хворобі, цукровому діабеті; безпечний для застосування під час вагітності. Препарат не впливає негативно на здатність керувати транспортними засобами, обслуговування машин і механічних приладів. Уникати контакту розчину з очима. У разі контакту, промити великою кількістю води. У разі виникнення недуги звернутись до спеціаліста. Не вживати після закінчення терміну придатності. Не застосовувати у дітей, віком до 6 років.

ЗБЕРІГАННЯ: Зберігати при кімнатній температурі у місці, недоступному для дітей та неуповноважених осіб.

ГАРАНТІЯ: Фірма АРКОНА дає можливість заміни або повернення вартості товару, у випадку підтвердженої вади. Виробник не несе відповідальності за будь-які збитки чи що виникли внаслідок неправильного чи неналежного використання препарату.

Дата останньої актуалізації інструкції: 01.06.2021